GOJO

L'HYGIÈNE DES MAINS AUJOURD'HUI

Votre ressource canadienne pour les dernières nouvelles en matière de développement du programme de contrôle efficace des infections et des meilleures pratiques.

Numéro 3 Automne 2010

Prévention du SARM dans les milieux de soins de santé

Jane Kirk M. Sc., inf. aut., CIC, Spécialiste clinique

Le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) est un type possiblement dangereux de bactérie de staphylocoque qui résiste à certains antibiotiques incluant la méticilline, l'oxacilline, la pénicilline et l'amoxicilline.[1] Le SARM est fort et peut vivre jusqu'à six semaines sur les surfaces environnementales et se transmet facilement par contact de peau à peau ou en partageant des articles comme les rasoirs et les serviettes avec une personne infectée.[2]

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, il y a presqu'en tout temps entre 20 à 30 pour cent de la population en général qui transportent des bactéries de staphylocoque sur leurs mains ou dans leur nez sans être malades. Certaines de ces bactéries peuvent être du SARM. Les porteurs de bactéries sans symptômes sont considérés comme colonisés. Les symptômes d'une infection de la peau au staphylocoque, incluant le SARM, apparaissent souvent comme une bosse ou un endroit infecté sur la peau qui pourrait être[3] :

- Rouge
- Enflé
- Douloureux
- Chaud au toucher
- Plein de pus ou autre drainage
- Accompagné d'une fièvre

L'hygiène des mains est la mesure la plus importante pour le contrôle de la transmission du SARM avec des preuves suggérant que même de modestes augmentations dans l'hygiène des mains peut réduire les cas de SARM.[4] Il y a eu récemment une augmentation de l'utilisation des solutions à frotter à base d'alcool dans les milieux de soins de santé, car cela prend moins de temps que le lavage des mains traditionnel et est tout aussi efficace qu'un lavage avec du savon et de l'eau lorsque les mains ne sont pas visiblement sales.

Les mains des patients sont aussi souvent un site de contamination à l'ERV et au SARM.[5] En plus de l'hygiène des mains, d'autres précautions recommandées par le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI) incluent :

- **Décisions** sur le placement et le déplacement des clients/patients/résidents
- **Gestion sécuritaire** de l'équipement et de l'environnement
- **ÉPP approprié** supplémentaire
- **Communication efficace** vers les départements et autres installations appropriés
- **Éducation** pour le personnel, les clients/patients/résidents/et familles

1 Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Healthcare-associated Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus. Récupéré de : http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/ar_mrsa.html

2 Des soins de santé plus sécuritaires, maintenant! Campagne du Québec. Lutte contre les organismes résistant aux antibiotiques (ORA), en particulier le SARM. Récupéré de : http://www.saferhealthcarenow.ca

3 Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. National MRSA Education Initiative Preventing MRSA Skin Infection. Récupéré de : http://www.cdc.gov/mrsa

4,5 CCPMI Best Practices for Infection Prevention and Control of Resistant Staphylococcus aureus and enterococci. Récupéré de : http://www.gov.on.ca/english/providers/program/infectious/diseases/best_pract/bp_staff.pdf

DATES À NE PAS OUBLIER

Semaine du contrôle des infections
18 au 22 octobre 2010

Semaine nationale de la sécurité des patients
1 au 5 novembre 2010
www.asklistentalk.ca

Pour plus de détails sur notre offre de produit, veuillez communiquer avec nous à healthcare@GOJO.com.

C'EST un FAIT!

Une étude a montré que 1) le nombre moyen de jours supplémentaires d'hospitalisation attribuables à l'infection au SARM était de 14 jours, 2) le coût attribuable au traitement des infections au SARM était de 14 360 $ par patient, et 3) le coût d'isolement et de gestion des patients colonisés était de 1 363 $ par admission.

- Kim T, Oh PI, Simor AE. The economic impact of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Canadian hospitals. Infec Control Hosp Epidemiol. 2001;22(2):99-104.

Caractéristique du contenu

SOLUTIONS DES POINTS DE SOINS

Les infections en lien avec les soins de santé (IAS) peuvent causer divers risques de santé pour les patients et mener à des coûts inutiles pour les institutions hospitalières. Le Ministère de la santé et des soins de longue durée (MSSLD) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) identifient des moments clés dans le processus des soins des patients lorsque le risque de transmission est le plus élevé et l'hygiène des mains est essentielle.

Le MSSLD et l'OMS recommandent aux travailleurs de la santé de se laver les mains :

1. Avant de toucher un patient
2. Avant les procédures de nettoyage/aseptiques
3. Après le risque/l'exposition aux fluides du corps
4. Après avoir touché un patient
5. Après avoir touché le milieu environnant d'un patient

Le CCPMI et l'OMS recommandent qu'un produit d'hygiène des mains, par ex. une pommade à base d'alcool, si disponible, soit facile d'accès et aussi près que possible (par exemple à portée de la main), de l'endroit où se déroule le traitement des patients. Ces produits devraient être **accessibles sans avoir à quitter la zone des patients**.[1,2] La disponibilité de pommades pour les mains à base d'alcool au point de soins se traduit normalement par des **pommades pour les mains que le personnel transporte (flacons de poche), des distributeurs muraux, des contenants installés sur le lit du patient ou la table de chevet ou les chariots de pansements ou de médicaments**.[2] Pour aider les installations à maximiser la disponibilité des produits d'hygiène pour les mains pour les travailleurs de la santé, GOJO a conçu une variété d'options incluant les **Solutions Points de soins**.

PURELL® pour étui personnel

PURELL pour étui personnel sont des produits conçus pour être transportés par les travailleurs de la santé. GOJO a conçu la **PURELL PERSONAL™ pince escamotable d'équipement**. Ce système de désinfectant pour les mains portable :

- Se pince à la ceinture ou à la poche
- Donne accès à PURELL en plaçant sur la personne
- Convient pour les flacons pompes PURELL de 59 et 45 mL

PURELL PERSONAL Pince escamotable d'équipement

Supports Points de soins

GOJO a plusieurs **Solutions de distribution de support de flacon**. Ces systèmes de distribution sont conçus pour être placés sur un bureau rendant ainsi PURELL accessible sur les **tables des patients et dans les aires de réception, les bureaux administratifs et les postes d'infirmières** partout dans l'édifice. Tous les systèmes conviennent pour les flacons de PURELL désinfectant instantané pour les mains de 236 mL.

- PURELL PAL
- PURELL Chariot de bureau
- PURELL CLASSIC™ Support

PURELL PAL

PURELL CLASSIC Support

Fixations Points de soins

GOJO a plusieurs **Solutions de distribution à fixations**. Ces fixations se montent sur les **côtés de lit, les chariots médicaux, les entrées de porte, les murs** et autres endroits pratiques pour permettre aux travailleurs de la santé d'avoir accès facilement aux pommades pour les mains à base d'alcool sans devoir quitter la zone des patients.

- PLACES™ Support
- Supports HOOK-ON
- 535 mL Fixation murale

535 mL Fixation murale

354 mL support HOOK-ON

Solutions Points de soins	Numéro de Commande	Numéro d'Emballage
PURELL PERSONAL Pince escamotable d'équipement (Utiliser avec les flacons de mousse de 45 mL ou de gel de 59 mL*)	9608-24	24
PLACES Support (utiliser avec le flacon de 354 mL*)	9005-12	12
Support HOOK-ON pour le flacon de 354 mL*	9007-12	12
Support HOOK-ON pour le flacon de 535 mL*	5701-12	12
Fixation murale de flacon pompe (utiliser avec le flacon de 535 mL*)	5700-06	6
PURELL Pal (utiliser avec le flacon de 236 mL*)	9600-PL1-CAN	12
PURELL Chariot de bureau (utiliser avec le flacon de 236 mL*)	9600-DC1-CAN	12
PURELL CLASSIC Support (utiliser avec le flacon de 236 mL*)	9614-12-CAN00	12

*produit vendu séparément

Produits Recommandés Solutions Points de soins	Numéro de Commande	Numéro d'Emballage
PURELL 70 Désinfectante instantanée pour les mains moussant hydratant		
Flacon pompe de 535 mL	5795-04-CAN00	4
Flacon pompe de 45 mL	5695-24-CAN00	24
PURELL 70 Désinfectant instantané pour les mains		
Flacon pompe de 354 mL	9770-12-CAN00	12
PURELL Désinfectant instantané pour les mains		
Flacon pompe de 236 mL	9652-12-CAN00	12
PERSONAL Flacon pompe de 59 mL	9606-24-CAN	24

1 Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI) Routine Practices And Additional Precautions In All Health Care Settings. Ministère de la santé et des soins de longue durée (MSSLD). Août 2009

2 Organisation mondiale de la Santé. A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy. Août 2009. http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_IER_PSP_2009.02_eng.pdf

Un regard sur l'avenir

Dans le prochain numéro

Hygiène des Mains pour les patients, les résidents et les visiteurs

SOLUTIONS *Lingettes d'hygiène pour les mains* des patients

www.GOJOCanada.ca/healthcare

© 2010. GOJO Industries, Inc. Tous droits réservés.

PURELL est une marque déposée de Johnson & Johnson et est utilisée sous licence.